

**ANCIEN CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION  
APPLICABLE POUR LES ENFANTS NES AVANT LE 24 AVRIL 2016**

**A La Naissance :**

Tuberculose : BCG  
Hépatite virale B (HBV 1) : 1ère injection  
Poliomyélite orale

**A 1 Mois :**

Hépatite virale B (HBV-2) : 2ème injection  
Vitamine D3 : 1 ampoule orale de 200 000 UI

**A 3 Mois :**

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTC-1) : 1ère injection  
Haemophilus Influenzae (HIB-1) : 1ère injection  
Poliomyélite orale

**A 4 Mois :**

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTC-2) : 2ème injection  
Haemophilus Influenzae (HIB-2) : 2ème injection  
Poliomyélite orale

**A 5 Mois :**

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTC-3) : 3ème injection  
Haemophilus Influenzae (HIB-3) : 3ème injection  
Hépatite virale B (HBV-3)  
Poliomyélite orale **A 6 Mois :**  
Vitamine D3 : 1 ampoule orale de 200 000 UI

**A 9 Mois :**

Anti-rougeoleux

**A 18 Mois :**

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTC-4) : 4ème injection  
Haemophilus Influenzae (HIB-4) : 4ème injection, rappel  
Poliomyélite orale

**A 6 Ans :**

Diphtérie-Tétanos **Enfant** (DT)  
Anti-rougeoleux  
Poliomyélite orale

**Entre 11 et 13 Ans :**

Diphtérie-Tétanos **Adulte** (dose d'anatoxine diphtérique plus faible)  
Poliomyélite orale

**Entre 16 et 18 Ans :**

Diphtérie-Tétanos-**Adulte** (dose d'anatoxine diphtérique plus faible)  
Poliomyélite orale

**Tous Les 10 Ans à partir de 18 ans:**

Diphtherie-Tétanos-**Adulte** (dose d'anatoxine diphtérique plus faible)

- La prévention du rachitisme nécessite la prise de vitamine D mais également une exposition régulière au soleil des membres inférieurs de l'enfant pendant 10 mn.